

Указания за употреба

Подофилин / подофилум 20% в тинктура от бензоин

Само за външна употреба. Да не се поглъща. Да се пази от деца.

Колко често се прилага?

Обичайната честота на приложение на подофилинова/подофилум смола в тинктура от бензоин е:

1 път седмично

Продуктът не се използва всеки ден.

Как се прилага?

- Мястото се измива и подсушава добре.
- Здравата кожа около брадавицата се защитава с тънък слой вазелин.
- С апликатор или клечка за уши се нанася много малко количество само върху брадавицата.
- Да не се допуска разтичане върху здрава кожа.
- Остава се да изсъхне напълно.
- След указаното време мястото се измива добре със сапун и вода.

Колко време трябва да остане върху кожата?

При първо приложение е препоръчително времето на контакт да бъде по-кратко, например:

30–60 минути

Ако се понася добре, при следващи приложения времето може да бъде според указанията на лекаря/фармацевта, обикновено:

1–4 часа

Да не се оставя върху кожата повече от 4 часа.

Колко дълго продължава лечението?

Обикновено се прави по едно приложение седмично, като ефектът се проследява след всяко приложение. Често лечението се ограничава до около:

3–4 седмици

В някои схеми може да се продължи до 6 седмици, но само при добра поносимост и след преценка

от лекар/фармацевт.

Важни ограничения

Да не се третира голяма площ наведнъж. Обичайните ограничения за една процедура са:

- общо количество под 0,5 ml;
- обща третирана площ под 10 cm²;
- нанасяне само върху брадавичната тъкан.

Важно преди и по време на употреба

Подофилин се отпуска по лекарско предписание. Преди употреба кажете на лекаря или фармацевта и спазвайте следното:

- ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите — не използвайте подофилин;
- ако имате диабет, нарушено кръвообращение или приемате кортикостероиди;
- не нанасяйте върху бенки, рождени петна, окосмени или кървящи брадавици, нито върху възпалена или раздразнена кожа;
- избягвайте контакт с очите, устата и лигавиците; при попадане в очите изплакнете обилно с вода и потърсете помощ.

Кога да спрете употребата?

Спрете употребата и потърсете лекар/фармацевт при:

- силно парене или силна болка;
- рана, мехур, язва или кървене;
- силно зачервяване или подуване;
- разпространяващо се възпаление;
- гадене, повръщане, диария;
- замайване, слабост, изтръпване или необичайни симптоми.

1 път седмично, с измиване след указаното време, максимум до 4 часа.



Пълната статия онлайн

Сканирайте кода, за да отворите статията на [Extempore.bg](https://extempore.bg) с повече информация.

Формата е приготвена индивидуално по Ваша рецепта в аптека Линк. Тези указания са обща информация и допълват, но не заменят указанията на Вашия лекар или фармацевт и етикета на приготвената форма.

аптека Линк · гр. Бургас, ул. Оборище 94 · тел. 0896 845 535 (Viber/WhatsApp) · 056/811 174 · Актуализирано: 12 юни 2026 г.